

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กลีอคซินเนีย (Gloxinia) เป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามเฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบไม้ดอกชนิดอื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเป็นไม้กระถางสำหรับเป็นของขวัญในโอกาสและเทศกาลต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง กลีอคซินเนียมีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล มีผู้นำเข้ามาในยุโรปเมื่อประมาณ 170 ปีมาแล้ว สำหรับในประเทศไทยนำเข้ามาประมาณ 40 ปีมานี้เอง (สมเพียร, 2526)

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

กลีอคซินเนียเป็นไม้ดอกในร่ม (house plant) เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้กระถาง ออกดอกได้ทุกฤดู ดอกและใบสวยงามมาก กลีอคซินเนียมีพุ่มต้นเตี้ย เมื่อปลูกลงในกระถางขนาด 5-6 นิ้วต้นจะสวยงามและได้สัดส่วนเหมาะสมที่จะใช้เป็นของขวัญในโอกาสและเทศกาลต่างๆ ได้ดี ปัจจุบันมีผู้ปลูกเลี้ยงกลีอคซินเนีย โดยสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตและจำหน่ายเป็นไม้กระถาง ให้กับผู้ที่สนใจ นำไปวางประดับบนโต๊ะทำงาน โต๊ะรับแขก โต๊ะอาหาร ใช้เป็นของขวัญของเยี่ยมผู้ป่วย ราคาจำหน่ายตั้งแต่กระถางละ 50 บาท จนถึง 100 บาท ขึ้นอยู่กับความดงามและความสมบูรณ์ของต้น (กันยา, 2535)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กลีอคซินเนียมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Sinningia speciosa* Benth. & Hook. มีชื่อสามัญว่า gloxinia หรือ sinningia อยู่ในวงศ์ Gesneriaceae (มยุรี, 2539) เป็นไม้เนื้ออ่อนล้มลุก พุ่มต้นสูงประมาณ 15 เซนติเมตร มีใบขนาดใหญ่ กว้างและถูกัดปักของกระถาง ขอบ葉เป็นตันอ่อนในจะมีสีเขียวปนเหลือง เมื่อต้นโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวแก่ตามลำดับ ใบเป็นรูปไข่ ขอบใบหยัก หนาน มีขนทั้งด้านบนใบและหลังใบ มองดูคล้ายกำมะหยี่ (กันยา, 2535) ดอกมีลักษณะเป็นรูประฆัง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 นิ้ว ก้านดอกยาวขดออกขึ้นเหนือระดับต้นและใบทำให้ดูกว่าเด่น จำนวนดอกนานคราวหนึ่งๆ อาจมีตั้งแต่ 1 ดอก ไปจนถึง 12 ดอก หรือมากกว่าเดือนแต่พันธุ์และการดูแลรักษา (มุกดา, 2547) จากการคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ทำให้ได้ดอกกลีอคซินเนียมีพันธุ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะลูกผสมชั่วแรก (F_1 hybrid) ที่มีดอกขนาดใหญ่ ทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน มีทั้งสีเดียวและสองสีในดอกเดียวกัน ดอกมีตั้งแต่สีขาว ชมพู แดงและน้ำเงิน (สมเพียร, 2525) นอกจากดอกที่สวยงามแล้วกลีอคซินเนียมีใบที่สวยงามอีกด้วย

ใบของกลีอคซิเนียเป็นรูปไข่ ขอบใบหยัก ใบหนานมีสีเขียวเข้มมีขันทั้งด้านหน้าใบและหลังใบ ขนาดของใบแตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์และความสมบูรณ์ของต้น การจัดเรียงของใบเป็นไปอย่างมีระเบียบ มีจังหวะสวยงาม อีกทั้งใบข้างล่างค่อนข้างแอ่นและปกคลุมด้านล่างปิดขอบกระถางไว้ ทำให้ดูสวยงามเด่นสะดูดตาแก่ผู้พนเห็น(สมเพียร, 2524) กลีอคซิเนียสามารถปลูกได้เกือบทุกภาคของประเทศไทย แต่ถ้าให้ได้ผลดีควรปลูกให้ออกดอกในฤดูหนาวจะได้ดอกที่มีสีสดใส ขนาดดอกใหญ่และนานอยู่ได้นานกว่าฤดูอื่น นอกจากนี้กลีอคซิเนียยังต้องการแสงไม่นำากนักและต้องการความชื้นในวัสดุปลูกสูงมาก การรดน้ำควรระวังให้พอเปียกเฉพาะตรงโคนต้น อย่าให้โคนใบ เพราะจะทำให้เกิดโรคเน่า สำหรับการให้น้ำในกลีอคซิเนียในระยะแรกของการเจริญเติบโต ควรให้น้ำสูตร 15-30-15 ที่มีส่วนประกอบของชาตุอาหารองและชาตุอาหารเสริม ละลายน้ำรดที่โคนต้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่วนในระยะออกดอกควรให้น้ำสูตรเร่งการออกดอก เช่น สูตร 23-19-17 ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตรจะพ่นเป็นฟอยที่ใบสัปดาห์ละครั้ง (มุกดา, 2547)

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์กลีอคซิเนียสามารถทำได้ 5 วิธี (ฉะลอ, 2542)

1. การเพาะเมล็ด เมล็ดของกลีอคซิเนียมีขนาดเล็กมาก เมล็ดหนัก 1 กรัม มีจำนวนถึง 27,500 เมล็ด การเพาะควรเพาะในกระเบื้อง หรือกล่องพลาสติก เครื่องปัลกใช้ทรายผสมดินมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน เกลี่ยให้เรียบแล้ววางเมล็ดลงไป พยายามให้เมล็ดกระจายสม่ำเสมอ หลังกว่าวนไม่ต้องกลบเมล็ด เพราะกลีอคซิเนียต้องการแสงสว่างขณะที่ออก การขยายพันธุ์วิธีนี้มีข้อดีตรงได้ต้นกล้าจำนวนมาก และได้ดอกที่สวยงาม แต่อาจลำบากน้ำใจง่าย

2. การตัดชำใบ วิธีที่นิยมกันคือ การใช้ก้านใบตัดชำโดยการตัดใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป ควรเป็นใบที่อ่อนส่วนกลางของต้น การตัดควรใช้มีดที่คมหรือสะอาด ตัดให้มีก้านใบติดด้วยประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วนำลงไปปักชำลงในวัสดุชำ ในช่วงแรกจะเกิดหัวขนาดเล็กๆ แผ่นใบเดิมจะเที่ยวและสลายตัวไปประมาณ 2-3 เดือน สามารถนำต้นอ่อนที่ได้ไปปลูกในกระถางต่อไป

3. การตัดชำยอด ทำได้โดยการตัดยอดจากต้นที่มียอดมากกว่า 1 ยอด ซึ่งนักจะเป็นต้นที่ปลูกจากหัว จะมีต้นอ่อนหลายต้น ตัดยอดให้มีใบติดมาด้วย 2-4 ใบ แล้วนำไปชำลงไปในวัสดุปักชำ จะเกิดรากขึ้นที่โคนรอยตัด เมื่อต้นแข็งแรงดีก็ย้ายลงกระถางปลูก

4. การใช้หัวปลูก การปลูกด้วยหัวจะทำหลังจากที่ต้นให้ดอกชุดที่ 2 และจะเริ่มไหรมะยะนี้ควรลดให้น้ำและปุ๋ย ชุดหัวขึ้นมาล้างแล้งผึ้งในตะแกรง ประมาณ 4-6 สัปดาห์ จะเริ่มแตกหน่อ

สามารถนำไปปลูกได้ การปลูกด้วยหัวครกอบหัวบางๆ อย่าให้หัวยอดอ่อน ประมาณ 3-4 เดือน จะใช้คอก

5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลีกซิเนีย การนำส่วนต่างๆ ของพืชไปเลี้ยงไว้ในอาหารที่มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การขยายพันธุ์วิธีนี้สามารถเพิ่มจำนวนต้นกล้าได้จำนวนมาก

โรคของกลีกซิเนีย

1. โรคลำต้นและรากเน่า ต้นเป็นโรคจะแสดงอาการเน่าเสื่อมตามที่กล่าวด้านบน ยอด และใบภายใน 2-3 วัน ต้นจะตายทั้งหมด สาเหตุเกิดจากเชื้อรา *Phytophthora sp.* การแพร่ระบาด เชื้อรากจะรับประทานโดยสถาปอร์บลิวไปตามลง และจากการกระเด็นของน้ำไปยังต้นไกลีกซิเนีย การป้องกันกำจัด หม่นตรวจสอบต้นไม้อยู่เสมอ เมื่อพบกระถางได้เป็นโรคให้รีบแยกออกไปทำลายแล้วใช้ยาฆ่าเชื้อรา เช่น ไซแนบ มาเนบ ฉีดพ่นติดต่อกัน 2-3 วัน

2. โรคใบบุดวงแห้ว เกิดจากเชื้อไวรัส อาการเป็นรอยดำสีเหลืองเป็นวงช้อนกันบนใบ เกิดได้ทั้งยอดอ่อนและใบแก่ไม่มีทางแก้ไข นอกจากเผาทำลาย แล้วยังฉีดพ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไม่ให้แมลงที่เป็นเชื้อพาหะนำเชื้อไวรัสติดกับต้นอื่นๆ

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (soilless culture) เป็นวิธีการปลูกพืชที่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการลักษณะของการเลียนแบบการปลูกพืชบนดิน แต่ไม่นำดินมาใช้เป็นวัสดุปลูก หลักการพื้นฐานในการทำให้พืชเจริญงอกงามและเติบโตคือการใช้น้ำที่มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ครบถ้วนตามที่พืชต้องการ เป็นการทดแทนธาตุอาหารที่มีอยู่เดิมในดิน ต้นพืชสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ปัจจุบันประชากรในหลายประเทศทั่วโลกต่างนิยมหันมาปลูกพืชด้วยวิธีนี้กันมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง สำหรับพืชที่ปลูกโดยวิธีนี้สามารถปลูกได้ตั้งแต่ผู้ที่ปลูกเป็นงานอดิเรกที่ทำเป็นพื้นที่น้อยๆ ในบ้านพักอาศัยถึงระดับเกษตรกรที่ทำฟาร์มขนาดใหญ่เป็นทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายกันทั่วโลก

ราชบุรีและคณะ(2548) ระบุว่าการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นการปลูกพืชแบบหนึ่ง เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน สามารถปลูกพืชได้ในทุกสถานที่ต้องการโดยไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่ว่าจะปลูกจำนวนน้อยหรือการปลูกแบบเศรษฐกิจเชิงการค้า สามารถใช้เทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับพืชได้แบบทุกชนิดตั้งแต่ พืช ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เลื้อย จนถึงพืชยืนต้น แต่ ส่วนมากนิยมปลูกกับพืชผักไม่ผลที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงอายุสั้น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะต่างๆ ที่ไม่อำนวยในสภาพการผลิตจากวิธีการปลูกพืชโดยทั่วๆ ไป อาทิ เช่น สภาพดินที่ไม่เหมาะสม ดินเค็ม ดินเปรี้ยว สภาพอากาศ ณูค่า รวมถึงการขยายตัวของชุมชน ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรลดลงและราคาที่ดินสูงขึ้น นอกจากนี้การปลูกพืชโดยไม่ใช้คินยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้น โภชนาคพืชได้อย่างถูกต้องและแน่นอน จึงทำให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้คินสูงกว่าการปลูกพืชในดิน ยิ่งไปกว่านั้นการปลูกพืชโดยไม่ใช้คินยังประหยัด เวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเตรียมดินและกำจัดวัชพืช เกษตรสามารถปลูกพืชได้ต่อเนื่องตลอดปีในพื้นที่เดิม โดยไม่มีปัญหาการทำลายสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินมากเท่าข้อดี ส่วนในเรื่องของการตลาดเกษตรสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลผลิตให้ได้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มว่าการปลูกพืชโดยไม่ใช้คินจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย

ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้คิน

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, 2550)

1. การปลูกในสารละลายน้ำอาหาร เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากกว่าประเภทอื่นๆ راكของพืชจะจุ่นแข็งอยู่ในสารละลายน้ำอาหาร สามารถทำหน้าที่ได้ 2 อย่างพร้อมกัน คือ ดูดซึมน้ำอาหารและออกซิเจน วิธีการปลูกพืชในสารละลายน้ำอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ

1.1 แบบสารละลายน้ำหมุนเวียน

1.1.1 ไม่เติมอากาศ

1.1.2 เติมอากาศโดยใช้ปั๊มลม

1.2 แบบสารละลายน้ำหมุนเวียนใช้ปั๊ม เพื่อทำให้สารละลายน้ำหมุนเวียนเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืชโดยตรงและทำให้สารละลายน้ำอาหารไม่ตกตะกอน ต้นพืชจึงได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ ระบบนี้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเพื่อการค้า

1.2.1 การให้สารละลายน้ำหมุนเวียนใช้ปั๊ม (Deep Flow Technique:DFT)

1.2.2 การให้สารละลายน้ำหมุนเวียนใช้ปั๊ม (Nutrient Film Technique : NFT)

2. การปลูกให้รากลอยอยู่กลางอากาศ พืชได้รับสารอาหารและความชื้น โดยการฉีดฟอยไปที่ราก รูปร่างของระบบนี้ เช่น กล่องสี่เหลี่ยม กระโจมสามเหลี่ยมเป็นต้น ระบบนี้เหมาะสมกับพืชต้น

เตี้ย ถ้าเป็นพืชต้นสูงต้องมีการค้ำยันหรือใช้เชือกยึด ระบบนี้หมายความว่าสำหรับงานวิจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเริญเติบโต

3. การปลูกลงบนวัสดุชนิดต่างๆ เป็นการปลูกโดยใช้วัสดุปลูก ทำหน้าที่แทนดินสำหรับให้รากยึดเกาะและค้ำจุนต้นพืช เช่น แผ่นฟองน้ำ กระดาษ กระดาษ ผ้าใบ ฯลฯ บุยมะพร้าวไยหินเปลือกไม้ เป็นต้น คุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้คือ สามารถเก็บรักษาความชื้น ระบายน้ำได้ดีคงทน ไม่ย่อยสลายง่าย

วัสดุปลูก

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้องใช้วัสดุปลูกเพื่อให้เป็นส่วนช่วยให้เกิดการรองรับให้ต้นพืชทรงตัวอยู่ได้ ผู้ปลูกจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะหากการยึดเกาะหรือการรองรับไม่แน่นแข็ง แรงพองจะทำให้ต้นพืชล้มลงเป็นอุบัติเหตุของการเริญเติบโตของพืช ภาพรวมของวัสดุปลูกต้องคำนึงถึงหน้าที่ คุณสมบัติและสถานะของวัสดุปลูก ดังนี้ (ดิเรก, 2547)

1. หน้าที่ของวัสดุปลูกที่สำคัญ มี 4 อย่าง คือ

1.1 เป็นที่เกาะยึดค้ำยันลำต้นพืช

1.2 เป็นแหล่งสะสมน้ำให้แก่พืช

1.3 เป็นแหล่งที่ให้อาหารแก่พืช

1.4 เป็นแหล่งสะสมอาหารให้แก่พืช

2. คุณสมบัติของวัสดุปลูกที่สำคัญ มี 3 อย่าง คือ

2.1 การกระจายตัวของส่วนที่เป็นของแข็ง น้ำและอากาศในวัสดุปลูก ซึ่งใช้กำหนดการจัดการน้ำให้แก่พืช เช่น ความพรุน ความสามารถในการอุ้มน้ำและอากาศ

2.2 คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูก เช่น ความเป็นกรด - ด่าง ความจุในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นความสามารถของวัสดุปลูกที่จะดูดซึมซับแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช ความสามารถในการตรึงฟอฟอรัสและศักยภาพของแร่ธาตุอาหารพืช

2.3 คุณสมบัติทางชีวภาพของวัสดุปลูก เช่น อัตราส่วนของการบอนต์ในโตรเจน (C/N) ของอินทรีย์วัตถุของอัตราที่การถ่ายตัวไม่ทำให้มีผลต่อการขาดในโตรเจนในวัสดุปลูกและสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะเป็นประโยชน์หรือโทษต่อพืชที่ปลูก

3. สถานะของวัสดุปลูกที่สำคัญ มี 3 อย่าง คือ

3.1 สถานะของแข็งเพื่อเป็นที่เกาะยึดร่องรากและการตั้งตัวของต้นพืช

3.2 สถานะของเหลวสำหรับให้น้ำและแร่ธาตุแก่พืช

3.3 สถานะก้าวเพื่อการถ่ายเทอากาศ

การปรับปรุงวัสดุปูลูกให้มีสภาพเหมาะสมขึ้นนี้ สามารถทำได้ด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ตามราย เช่น ปูคอก ทรายหยาน ชูยมะพร้าว ถ่านแกลบ ฟางข้าว แกลบ เปลือกถัว บี๊ลีอย บีกบ ซังข้าวโพดและอื่นๆ วัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยปรับปรุงวัสดุปูลูกให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแต่กันไป เช่น การยึดคงต้น การอุ่มน้ำ การถ่ายเทอากาศและการทำให้รากไชชอนได้สะอาด (มุกดา, 2547) โดยทั่วไปวัสดุปูลูกจะมีบทบาทต่อการเริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช 4 ประการดังนี้ (ราชนทร์และคณะ, 2548)

1. ค้ำจุนส่วนของพืชที่อยู่เหนือวัสดุปูลูกให้ตั้งตรงอยู่ได้
2. เก็บสำรองธาตุอาหารพืช
3. กักเก็บน้ำเพื่อเป็นประโภชต์ต่อพืช
4. แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างรากพืชกับบรรยากาศ เหนือวัสดุปูลูก

วัสดุปูลูกที่นิยมใช้ในการปูลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

1. **ทราย (sand)** มีอนุภาคของเม็ดทรายเป็นส่วนใหญ่คือมากกว่า 85% มีอนุภาคของดินตะกอนและดินเหนียวต่ำกว่าชนิดละ 15% เมื่อจับดินทรายจะรู้สึกสากมือ อนุภาคของดินชนิดนี้เกาะกันอยู่หกวนๆ ไม่มีสารที่ช่วยให้อนุภาคดินเกาะกัน แม้เมื่อถูกน้ำแล้วนำมานึบหรือปั่นก็แตกออกจากกันได้ง่าย ดินทรายมีคุณสมบัติโปร่งมาก อุ่นน้ำน้อย เก็บรักษาธาตุอาหารได้น้อย ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แต่มีการระบายน้ำได้ดี อากาศในดินชนิดนี้มีมาก การขุดไถพรวนก็ทำได้ง่าย โดยไม่มีข้อเสียต่อโครงสร้างของดิน ถ้าปูลูกพืชในทรายต้องให้น้ำบ่อยๆ และให้ปุ๋ยบ่อยกว่าดินชนิดอื่น (นันทิยา, 2545) คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์พบว่า คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุไม่มีความหนาแน่นรวมเมื่อเทียบ 1.5-1.8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ 0.5-2 มิลลิเมตร ความพรุนต่ำ ความคงทนของโครงสร้างดี (อิทธิสนธ, ม.ป.ป.)

2. **ถ่านแกลบ (carbonized rice hull)** เป็นวัสดุที่ได้จากการนำแกลบมาเผาจนเป็นถ่าน อาจมีเศษส่วนอยู่บ้าง น้ำหนักเบาและมีความสามารถในการกักเก็บน้ำสูง จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงนำมาเป็นวัสดุปูลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสมบัติทางกายภาพนั้น ถ่านแกลบจะแตกหักง่ายและมีความเป็นด่างสูง ก่อนทำการเพาะปลูกควรที่จะนำมาแช่น้ำเพื่อลดความเป็นด่างโดยสรุปแล้วคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของถ่านแกลบจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที่ 7-8.5 มีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับอายุของถ่านแกลบ ถ้ามีอายุมากถูกจะล้างโดยฝนมากค่าความเป็นกรด-ด่าง จะลดลง มีความสามารถในการอุ่มน้ำสูง ความคงทนของโครงสร้างดี มีการถ่ายตัวน้ำอย มีการอัดแน่นบ้างหลังปูลูก อายุการใช้งานประมาณ 2-4 อาทิตย์ (อภิรักษ์, 2540)

3. บุยมะพร้าว (coconut dust) หรือเปลือกมะพร้าวสับที่สามารถหาได้ทั่วไปในเมืองไทย บุยมะพร้าวเป็นส่วนของ pith หรือ binding material มีคุณสมบัติในการระบายน้ำและอากาศ มีขนาดอนุภาคส่วนใหญ่อยู่ที่ 0.5-2.0 มิลลิเมตร มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมซับน้ำ 0.1 เซนติเมตรต่อวินาที ขนาดของช่องว่างส่วนใหญ่อยู่ในขนาด 0.0047 ไมครอน ความหนาแน่นรวม 0.06 กรัมต่อมิลลิเมตร ความหนาแน่นอนุภาค 1.55 กรัมต่อมิลลิเมตร ความพรุนทั้งหมด 95.53 เปอร์เซ็นต์ ช่องว่างอากาศ 4.87 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นที่เป็นประโยชน์ 35.28 เปอร์เซ็นต์ ความชุ่มชื้นในการดูดซึมน้ำ ความชื้นไว้ได้ 8.76 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพแห้งความชื้นจะลดลงเหลือ 11.7 เปอร์เซ็นต์ มีไนโตรเจน 0.41 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.02 เปอร์เซ็นต์ โปปแตสเซียม 0.89 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 0.31 เปอร์เซ็นต์ แมกนีเซียม 0.45 เปอร์เซ็นต์ และบีเดา 6.6 เปอร์เซ็นต์ ความเป็นกรดเล็กน้อย pH ประมาณ 6.2 บุยมะพร้าวมีคุณสมบัติทางพิสิกส์ที่สามารถนำมาผสมกับทราย ทำให้ความพรุนและความหนาแน่นรวมของอนุภาคเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์โดยปริมาณของช่องว่างมีขนาดใหญ่และเหมาะสมในการนำมาปลูกพืชโดยใช้คินหรือเพากล้าพืช (มนูญ, 2544)

ชาตุอาหารและสารละลายน้ำชาตุอาหารพืช

ชาตุอาหารมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก การปลูกพืชโดยไม่ใช้คินจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องชาตุอาหารพืชและการเตรียมสารละลายน้ำชาตุอาหารพืชเป็นอย่างดี เพราะพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้คินไม่สามารถใช้ประโยชน์ชาตุอาหารจากธรรมชาติได้ ผู้ปลูกจะต้องจัดหาราตุอาหารให้พืชในรูปของสารละลายน้ำชาตุอาหาร ดังนั้นผู้ที่จะปลูกพืชโดยไม่ใช้คิน จะต้องมีความรู้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นอย่างดี

ชาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต มีทั้งหมด 16 ชาตุ ซึ่ง 3 ชาตุ คือ คาร์บอน ไออกซิเจน และออกซิเจน ได้จากน้ำและอากาศ และอีก 13 ชาตุ ได้จากการดูดกินผ่านทางราก ทั้ง 13 ชาตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามปริมาณที่พืชต้องการ คือ ชาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากและชาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณน้อย ดังนี้ (ราชนทรัพย์และคณะ, 2548)

1. ชาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก (macronutrient elements)

1.1 ไนโตรเจน (N) พืชสามารถดูดกินในไนโตรเจนได้ทั้งในรูปของแอนโนมเนียมไออกอน (NH_4^+) และไนเตรตไออกอน (NO_3^-) ซึ่งในไนโตรเจนส่วนใหญ่ในสารละลายน้ำชาตุอาหารพืชจะอยู่ในรูปไนเตรตไออกอน เพราะถ้ามีแอนโนมเนียมไออกอนมาก จะเป็นอันตรายต่อพืชได้ สารเคมีที่ให้ไนเตรตไออกอน คือ แคลเซียมไออกอน และโปปแตสเซียมไนเตรต นอกจากนี้ยังอาจได้จากการดูดคินประสา (HNO₃) ที่ใช้ในการปรับความเป็นกรดด่างของสารละลายน้ำชาตุอาหารพืช

1.2 ฟอสฟอรัส (P) ในการปลูกพืชไร่คิน พืชต้องการธาตุฟอสฟอรัสไม่มากเท่ากับธาตุในโตรเจนและโป๊แตสเซียม ประกอบกับไม่มีปัญหาในเรื่องความไม่เป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสเหมือนในดิน พืชจึงได้รับฟอสฟอรัสถอย่างเพียงพอ รูปของฟอสฟอรัสที่พืชสามารถดูดกินได้คือ mono-hydrogen phosphate ion (HPO_4^{2-}) ส่วนจะอยู่ในรูปไดมานากรกว่ากันซึ่งอยู่กับความเป็นกรดด่างของสารละลายในขณะนั้น

1.3 โป๊แตสเซียม (K) รูปของโป๊แตสเซียมที่พืชดูดกินได้ คือ potassium ion (K^+) ธาตุโป๊แตสเซียมที่มีมากเกินพอด้วยไปรบกวนการดูดกินแคลเซียมและแมgnีเซียม สารเคมีที่ให้ธาตุโป๊แตสเซียม คือ potassium nitrate และ potassium phosphate

1.4 แคลเซียม (Ca) รูปของแคลเซียมที่พืชดูดกินได้คือ calcium ion (Ca^{2+}) แหล่ง Ca^{2+} ที่ดีที่สุดคือ calcium nitrate เนื่องจากละลายน้ำง่าย ราคาไม่แพงและยังให้ธาตุในโตรเจนด้วย แคลเซียมที่มีมากในสารละลายธาตุอาหารพืช จะไปรบกวนการดูดกิน โป๊แตสเซียมและแมgnีเซียม ในน้ำตามธรรมชาตินั้นจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณหนึ่ง การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชจึงควรคิดแคลเซียมในน้ำด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาในการมีแคลเซียมมากเกินไป

1.5 แมgnีเซียม (Mg) รูปของแมgnีเซียมที่พืชดูดกินได้คือ magnesium ion (Mg^{2+}) สารเคมีที่ให้แมgnีเซียมคือ magnesium sulfate (MgSO_4) ในน้ำธรรมชาติจะมีแมgnีเซียมอยู่ด้วยจะน้ำในการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชจึงควรคำนึงถึงด้วย แมgnีเซียมที่มีอยู่มากเกินพอด้วยสารละลายจะไปรบกวนการดูดกินธาตุ โป๊แตสเซียมและแคลเซียม

1.6 กำมะถัน (S) รูปของกำมะถันที่พืชสามารถดูดกินได้ คือ sulfate ion (SO_4^{2-}) พบว่าไม่ค่อยมีปัญหาการขาดกำมะถันในระบบการปลูกพืชไร่คิน เพราะพืชต้องการกำมะถันในปริมาณน้อย และจะได้รับจากสารเคมีพอกเกลือซัลเฟตของ K, Mg, Fe, Cu, Mn และ Zn เป็นต้น

2. ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณน้อยหรือจุลธาตุ (micronutrient elements)

2.1 ไบرون (B) การแสดงอาการขาดธาตุไบرونของพืชพบเห็นได้ยากเนื่องจากพืชต้องการในปริมาณน้อย ซึ่งในน้ำธรรมชาติก็มีไบรอนอยู่ด้วย สารเคมีที่ให้ borate ion (BO_3^{3-}) ซึ่งพืชสามารถดูดกินได้คือ boric acid (H_3BO_3)

2.2 สังกะสี (Zn) รูปที่พืชสามารถดูดกินได้คือ zinc ion (Zn^{2+}) ซึ่งได้จาก zinc sulfate (ZnSO_4) หรือ zinc chloride (ZnCl_2)

2.3 ทองแดง (Cu) สารเคมีที่ให้ Copper ion (Cu^{2+}) คือ copper sulfate (CuSO_4) หรือ copper chloride (CuCl_2)

2.4 เหล็ก (Fe) พืชดูดกินในรูป Fe^{+2} หรือ Fe^{+3} สารเคมีที่ให้ธาตุเหล็กที่มีราคาถูกที่สุดคือ ferrous sulfate (FeSO_4) ซึ่งละลายน้ำได้ง่าย แต่ก็จะตกเป็นตะกอนได้เร็ว จึงต้องควบคุมสภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆเหล่านี้ โดยการใช้เหล็กในรูปคิเลต (Fe-chelate) ซึ่งเป็นสารเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเหล็กและสารคิเลต ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ เหล็กคิเลต เป็นสารประกอบเชิงซ้อนสามารถถอดตัวอยู่ในรูปสารละลายธาตุอาหารพืชและพืชดูดกินได้ เหล็กคิเลตที่นิยมใช้กันอยู่ในรูปของ EDTA หรือ EDDHA

2.5 แมงกานีส (Mn) มีลักษณะเหมือนกับเหล็กคือ ความเป็นประโยชน์ของแมงกานีสจะถูกควบคุมโดยความเป็นกรดด่าง ถ้าสารละลายธาตุอาหารพืชมีลักษณะด่าง ความเป็นประโยชน์ของแมงกานีสจะลดลง manganese ion (Mn^{+2}) ซึ่งเป็นรูปที่พืชสามารถดูดกินได้ จะได้จากสารเคมี manganese sulfate ($MnSO_4$) หรือ manganese chloride ($MnCl_2$)

2.6 โมลิบดินัม (Mo) รูปที่พืชสามารถดูดกินได้คือ molybdate ion (MoO_4^{-2}) ซึ่งได้จากสาร sodium molybdate หรือ ammonium molybdate

2.7 คลอร์อเรน (Cl) ในน้ำจะมีคลอร์อเรนในรูปของคลอไรด์ (chloride ion (Cl^-)) ซึ่งเป็นรูปที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์เจือปนอยู่ด้วย จากการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชจะได้คลอไรด์จากสารเคมี potassium chloride รวมทั้งจากชุดธาตุบางธาตุที่อยู่ในรูปของสารประกอบคลอไรด์ ถ้าสารละลายมี Cl^- มากเกินพอด้วยจะไปมีผลยับยั้งการดูดกิน anions ตัวอื่น เช่น nitrate (NO_3^-) และซัลไฟด์ (SO_4^{2-})

ประโยชน์ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีดังต่อไปนี้ (นกคต, 2538)

1. ใช้ทดแทนการปลูกพืชในดินที่มีปัญหา เช่น ดินเก็ม ดินกรด และดินด่าง
2. ประหยัดพื้นที่ในการใช้ปลูกพืช เพราะการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สามารถที่จะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าการปลูกในดิน
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาพืช เพราะชาตุอาหารและน้ำอยู่ในระบบที่หมุนเวียนได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช
4. ย่นอายุการเก็บเกี่ยวให้สั้นลงกว่าปลูกในดิน
5. สามารถควบคุมโรคและแมลงได้ดีกว่าในดิน เนื่องจากใช้พื้นที่ขนาดเล็กกว่า
6. ใช้ปลูกบำรุงรักษาพืชให้อยู่รอดมากขึ้น ภายหลังนำออกจากการเพาะเดี่ยงเนื่องเยื่อ
7. เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชในเมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่ผิวดินจำกัด
8. ใช้ปลูกในยานอวกาศ

ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้คิน

การปลูกพืชในระบบโดยไม่ใช้คิน เป็นการปลูกพืชโดยใช้หลักวิชาการแบบวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ โดยการเลียนแบบการปลูกพืชบนคิน พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีอนาคตอุตสาหกรรม ต่างๆ ที่จะถูกผลิตในน้ำเพื่อทดแทนธาตุอาหารที่มีอยู่ในคิน ซึ่งวิธีการนี้มีข้อดีหลายประการอาทิเช่น (ฉบับย่อ, 2534)

1. สามารถปลูกพืชได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็สามารถปลูกพืชรุ่นต่อไปได้ทันที เนื่องจากไม่ได้ปลูกพืชลงคินจึงไม่ต้องทิ้งระยะเวลาเพื่อทำการพักคิน ตากคิน กำจัดวัชพืช และเตรียมแปลงปลูกใหม่ การปลูกพืชในคินต่อเนื่องเป็นเวลานาน ยังทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ แต่การปลูกพืชโดยไม่ใช้คินสามารถปลูกพืชต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องกลัวปัญหานี้ เนื่องจากแหล่งอาหารของพืชไม่ได้มากจากคิน แต่มาจากธาตุอาหารต่างๆ ที่ให้ทางสารละลายธาตุอาหาร นอกจากนี้การปลูกพืชโดยเทคนิคนี้ไม่ขึ้นกับฤดูกาล เพราะมีการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การปลูกพืชต่อเนื่องตลอดปี

2. สามารถปลูกพืชได้แม้ในที่ที่ไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับปลูกพืชการอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ซึ่งที่ดินมีรา帮ง ผู้อยู่อาศัยในที่ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเม้น และหอพักไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกพืช สามารถปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร หรือไม้ดอกไม้ประดับ ได้โดยใช้ระบบไฮโดรโพนิกส์ขนาดเล็กวางบริเวณพื้นที่ว่างที่มีอยู่เล็กน้อย เช่น ริมหน้าต่าง ทางเดิน คาดฟ้า พื้นที่เล็กๆ หลังบ้านเป็นต้น

3. สามารถปลูกพืชได้แม้ในที่ที่ดินไม่เหมาะสม ในบางพื้นที่มีพื้นที่อยู่มากมาย แต่ใช้ทำการเพาะปลูกพืชไม่ได้ เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินทะเลกราย พื้นที่ที่เป็นหิน พื้นที่ภูเขา ดินเค็ม ดินกรด ดินด่าง พื้นที่อยู่ในเขตแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำชลประทาน การแก้ปัญหาเหล่านี้ทำได้ยากต้องใช้เวลานาน และใช้เงินประมาณมาก สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่ปลูกพืชโดยไม่ใช้คิน เพราะนอกจากจะไม่ใช้คินเป็นแหล่งอาหารสำหรับพืชแล้วยังเป็นวิธีที่ใช้น้ำน้อยและใช้อุ่นไม่ประสิทธิภาพ พืชไม่มีปัญหาด้านน้ำ ไม่มีการสูญเสียน้ำจากการซึมลึก การไหลทิ้งหรือการแย่งน้ำจากวัชพืช ไม่มีปัญหาในการให้น้ำกินไป

4. พืชเจริญเติบโตได้เร็วและให้ผลผลิตสูง การปลูกพืชด้วยวิธีดังเดิม ไม่สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้พอดีกับความต้องการของพืชได้ นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียธาตุอาหารจากกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคินและในอากาศ ตลอดจนการแย่งธาตุอาหารจากพืช แต่การปลูกพืชโดยไม่ใช้คิน สามารถควบคุมปริมาณธาตุอาหารได้ดีกว่าการปลูกในคิน โดยสามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการของพืชได้ พืชได้รับสารอาหารในรูปอนิทร์โดยตรง ทำให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไม่มีปัญหาการแย่งธาตุอาหารโดยวัชพืช

จึงทำให้พืชเริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง ในอีกแห่งหนึ่งถ้าคำนึงถึงผลผลิตต่อปีผลผลิตจากการปลูกพืชโดยไม่ใช้คินจะสูงกว่าการปลูกด้วยระบบดั้งเดิม เนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นและปลูกต่อเนื่องได้ตลอดปีไม่ขึ้นกับฤดูกาล ทำให้สามารถปลูกพืชได้นานครั้งกว่าในเวลาเท่ากัน

5. ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ สะอาดและคุณภาพดี เนื่องจากมีการควบคุมปริมาณธาตุอาหารตามที่พืชต้องการ ตลอดจนการควบคุมปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ได้ทั่วถึง ทำให้ได้ผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอ มีรูปร่าง ขนาด สี ไกล์เดียงกัน ผลผลิตไม่ได้สัมผัสกับคินจึงสะอาดและน่ารับประทาน การปลูกพืชวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะผลิตพืชที่ต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพและความสม่ำเสมอ เช่น พักส่งออก พักทดสอบการนำเข้าและผ้าส่งขายในชุมเปอร์มาร์เก็ต

6. ใช้แรงงานน้อย การปลูกพืชโดยไม่ใช้คินจะใช้แรงงานน้อยกว่าการปลูกพืชด้วยระบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่ต้องมีการเตรียมคิน ไม่ต้องทำเขตกรรม เช่น ให้น้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช มีศัตรูพืชน้อยกว่า จึงใช้แรงงานในการกำจัดน้อยกว่า การเพาะเมล็ด การย้ายปลูก การเตรียมแปลงปลูก และการเก็บเกี่ยวทำได้ง่ายจึงใช้แรงงานน้อยกว่า

7. ลดการใช้สารเคมี เนื่องจากมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ควบคุมศัตรูพืชได้ง่าย เพราะการไม่ใช้คินในการปลูกพืชทำให้ไม่มีปัญหาโรคแมลงที่อยู่ในคินตลอดจน ไม่มีปัญหาวัชพืช ส่วนโรคและแมลงที่ระบาดทางอากาศก็สามารถลดการใช้สารเคมีได้ โดยการใช้โรงเรือนตาข่าย

8. ปลูกพืชได้ทุกฤดูกาลและทุกสภาพอากาศ เนื่องจากมีการควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้พอดีกับความต้องการของพืชและมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การที่สามารถปลูกพืชได้ตลอดปีไม่ขึ้นกับฤดูกาล ทำให้สามารถควบคุมราคาได้โดยไม่ขึ้นลงตามฤดูกาล

นอกจากข้อดีต่างๆ เหล่านี้แล้ว การปลูกพืชโดยไม่ใช้คินก็ยังมีข้อเสียหลายประการ ดังนี้
(ดิเรก, 2547)

1. มีต้นทุนการผลิตเริ่มต้นค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากมายและมีราคาแพง แต่ค้วยภาพในการคืนทุนเร็ว
2. ผู้ปลูกต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์มากพอในการควบคุมดูแล
3. ต้องการการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ
4. ถ้าหากไม่มีความรู้และความสามารถในการจัดการที่ดีพอ อาจทำให้ปริมาณธาตุอาหารในผลผลิตพืช เช่น ในเตรทสูงจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
5. วัสดุปลูกบางชนิดเน่าเสียหรือลายยาก อาจเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีการควบคุมดูแลที่ดีพอ

นอกจากนี้สารอาหารพืชที่ใช้แล้ว หากไม่มีการจัดการที่ดีพอ ก็อาจสร้างปัญหาให้แก่น้ำได้ เช่น ในเตอร์ทเป็นต้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยไม่ใช้ดิน

รัชดาและวัฒน์ (2535) ได้ทำการทดลองปลูกต้นแกลบดิโอลัสในระบบ NFT (Nutrient Film Technique) เพื่อศึกษาผลของวัสดุรองปลูกชนิดต่างๆ คือ Poly-urethane ที่ใช้ทำเบาะ รดยนต์, Poly-urethane ที่ใช้ล้างจาน, Poly-urethane ที่ใช้เป็นวัสดุปลูกในประตูเก็บเยี่ยมและแท่ง Rock Wood พบว่าวัสดุรองปลูกแต่ละชนิด ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพบว่าคุณภาพของแกลบดิโอลัสไม่ดีเท่าแกลบดิโอลัสที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป นุสุทาง (2544) ได้ทำการเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเกรดเกรดต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกลีอกซิเนีย พันธุ์ Quick Red โดยศึกษาการใช้ปุ๋ยกรด 15-30-15, 15-15-15 และ 20-20-20 อัตรา 100 มิลลิกรัม ผสมน้ำ 50 มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ย พบว่าความกว้างของใบ ความยาวของใบ ความยาวของก้านดอก อายุการออกดอก ทุกวิธีการ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ขนาดของทรงพุ่มพบว่า การใส่ปุ๋ย 15-15-15 ให้ขนาดของทรงพุ่มใหญ่ที่สุด แตกต่างจากวิธีการใส่ปุ๋ยชนิดอื่นๆ การใส่ปุ๋ยทุกเกรด ให้จำนวนใบ และน้ำหนักของหัวมากกว่าวิธีการที่ไม่ใส่ปุ๋ย และความกว้างของดอกในการใส่ปุ๋ย เกรด 15-30-15 ให้ความกว้างของดอกกว้างมากที่สุดแตกต่างจากการใส่ปุ๋ยกรดอื่นๆ โสสะยาและสีบศักดิ์ (2544) ได้ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพรีเซียกระถาง จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ Carimero, Fidelio, Gompey, Popey, Smarty, Suzy โดยปลูกฟรีเซียในกระถางขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 หัวต่อกระถาง ในวัสดุปลูก 4 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 ดิน, ทราย, แกลบดิน, ถ่านแกลบ, บุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1:1:1:1 โดยปริมาตร สูตรที่ 2 ดิน, ทราย, แกลบดิน, ถ่านแกลบ อัตราส่วน 1:1:1:1 สูตรที่ 3 ดิน, ทราย, ถ่านแกลบ, บุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1:1:1 และสูตรที่ 4 ทราย, แกลบดิน, ถ่าน-แกลบ, บุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1:1:1 พบว่าการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของฟรีเซีย แต่ละพันธุ์ชั่งปลูกในวัสดุปลูกต่างกันมีความแตกต่างกัน การใช้วัสดุปลูกสูตรที่ 2 ให้ดีที่มีการเจริญเติบโต การแตกกอและคุณภาพดอกดีเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกสำหรับการปลูกฟรีเซียกระถาง จิตรามาศ (2545) ได้ทำการศึกษาผลของวัสดุปลูกในระยะเวลา 4 เดือน พบว่า การปลูกกล้วยไม้ช้าง โดยใช้ไขมมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก มีผลให้การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้าง ดีกว่าการใช้กระเช้าเปลือยที่ไม่ใส่วัสดุปลูก ทึ้งการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของลำต้น จำนวนใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ และความหนาของใบ โภวิทย์และดิเรก (2545) รายงานผลการวิจัยเรื่องวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกลีอกซิเนีย พบว่าการใช้วัสดุปลูกบุย

มะพร้าวผสมแกลบกับทราย อัตราส่วน 1:1:1 ให้ความกว้างของทรงพุ่ม ความกว้างใบและจำนวนใบไม่แตก ต่างกันทางสถิติกับวัสดุปูกลูกขุยมะพร้าวผสมทราย อัตราส่วน 1:1 รองลงมาคือ วัสดุปูกลูกแกลบผสมทรายอัตราส่วน 1:1 วัสดุปูกลูกขุยมะพร้าวผสมแกลบผสมทรายให้ความกว้างทรงพุ่ม ความกว้างใบ และจำนวนใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ ณัชชาและณัฐา (2546) รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของวัสดุปูกลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพรวิกประดับ จากผลการทดลองพบว่า ต้นพรวิกประดับที่ใช้วัสดุปูกลูกขุยมะพร้าว : ทราย อัตราส่วน 2:1 ให้ความสูงของต้นดีกว่าวัสดุปูกลูกอื่นๆ เมื่อศึกษาถึงความกว้างของทรงพุ่มพบว่า ใช้วัสดุปูกลูกขุยมะพร้าวผสมทรายทราย อัตราส่วน 2:1 ให้ความกว้างของทรงพุ่มดีกว่าวัสดุอื่นๆ และเมื่อศึกษาทางด้านน้ำหนักของผลพบว่า การใช้วัสดุปูกลูก Peatmoss ให้น้ำหนักเฉลี่ยของผลมากกว่าวัสดุปูกลูกอื่นๆ สุวรรณีและคณะ (2548) รายงานการวิจัยเรื่องวัสดุที่แตกต่างกัน เมื่อนำไปปลูกดาวเรืองในระบบ Nutrient Film Technique (NFT) พบว่าการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและ กิ่ง ใน ความสูง ทรงพุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น หลังบ่ายปีกุกมีความแตกต่างกัน โดยดาวเรืองที่ปูกลูกโดยใช้ทรายและขุยมะพร้าวมีการเจริญเติบโตดีที่สุด ส่วนคุณภาพดอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกและความยาวของก้านดอกในทุกวัสดุปูกลูกที่มีขนาดและความยาวดอกใกล้เคียงกัน

2. การปูกลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดิน

ตนิมนันต์และศุภชัย (2538) ได้ทดลองปูกลูกสาระแน่ ในระบบปูกลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ศึกษาถึงความเข้มข้นของสารละลายน้ำอาหาร 3 ระดับ คือ EC₁, EC₂, EC₃ ในระบบที่ไม่มีการเพาอากาศพบว่า ผลผลิตที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันและการปูกลูกโดยวิธีนี้จะให้ผลผลิตดีกว่าการปูกลูกในดิน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้มาก นอกจากนี้ได้มีการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคในส่วนต่าง พบว่าสาระแน่ที่ปูกลูกในระบบการปูกลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้รับการยอมรับสูงสุดถึง 100% ซึ่งมากกว่าสาระแน่ที่มาจากห้องทดลอง พระมหาศ (2540) ศึกษาการเจริญเติบโตและผล ผลิตของแตงกวายุโรป ที่ทำการปูกลูกในช่วงฤดูหนาว พบว่ามีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีที่สุด ใน การเปรียบเทียบวัสดุปูกลูกที่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ (ฟองน้ำอัดและไยหิน) กับวัสดุปูกลูกภายในประเทศ (ขุยมะพร้าว) พบว่า การเจริญเติบโตของต้นแตงกวายุโรปไม่แตกต่างกันทางสถิติ อรพิน (2540) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพเข้มข้นร้อยละ 0 (control), 25, 33 และ 50 ร่วมกับสารละลายน้ำตูรปะยุกต์ Knop สำหรับปูกลูกพักกาดห้อมพันธุ์ grand rapid ในระบบไฮโดรโพนิกส์ แบบท่อ ที่มีการพรางแสงและไม่มีการพรางแสง พบว่าน้ำมักที่ปูกลูกโดยใช้น้ำมักชีวภาพร้อยละ 33 มีการเจริญเติบโตมากกว่าการใช้น้ำมักร้อยละ 25 และ 50 และการปูกลูกแบบพรางแสงทำให้พักกาดห้อมมีการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มมากกว่าการปูกลูกกลางแจ้ง ถึงแม้ว่าพักกาดห้อมจะมีการสะสมในเตรทลดลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่การสะสมในไตรท์จะสูงขึ้น โดยพักกาดห้อมที่

ปลูกในสารละลายน้ำตัวควบคุม Knop (control) มีการสะ淀ไนเตรทและไนไตรท์สูงสุดทั้งปลูกภายในตัวได้จากการพรางแสงและไม่พรางแสง จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการปลูกผักกาดหอมโดยไม่พรางแสง โดยใช้น้ำหมักชีวภาพร้อยละ 33 ผักกาดหอมจะมีการสะ淀ไนเตรทและไนไตรท์สูงสุดทั้งปลูกภายในตัวที่ต่ำ และการเจริญเติบโตจะอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับ control อรพิน (2541) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนต่อการสะ淀ไนเตรಥองผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ในโรงเรือน โดยใช้สารละลายน้ำตัวดัดแปลงที่มีการเพิ่มแคลเซียม 100 ppm มีสัดส่วน $\text{NO}_3^-:\text{NH}_4^+$ ratio 5 ระดับ ได้แก่ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, และ 0: 100 พบว่าผักกาดที่ปลูกในสารละลายน้ำตัวอาหารที่มี $\text{NO}_3^-:\text{NH}_4^+$ ratio เท่ากับ 15:25 มีน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง การเจริญเติบโตของลำต้นดีที่สุด แต่เมื่อ NH_4^+ ในสารละลายน้ำตัวอาหารมีมากกว่าร้อยละ 50 ของไนโตรเจนทั้งหมด ผักกาดหอมมีการเจริญเติบโตลดลง ในสารละลายน้ำตัวอาหารที่มี NH_4^+ ทำให้ผักกาดหอมมีการสะ淀ไนเตรทลดลงเมื่อเพิ่มระดับ NH_4^+ แม้ว่าที่สัดส่วน $\text{NO}_3^-:\text{NH}_4^+$ ratio เท่ากับ 100:0 ผักมีไนเตรทสะสมมากที่สุด แต่ไม่พบว่ามีการสะ淀ไนเตรทที่เกินกว่าค่าความปลอดภัย การสะ淀ไนไตรท์ของผักกาดหอมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับไนเตรท พบร่วมกับ red oak มีปริมาณไนเตรทสะสมมากกว่าพันธุ์ grand rapid และ green oak จากการทดสอบทางด้านประสิทธิภาพผู้บริโภคของผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลายน้ำตัว $\text{NO}_3^-:\text{NH}_4^+$ ratio เท่ากับ 75:25 มากรีดแต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อรพิน (2542) ได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร่ดินโดยใช้น้ำทึบจากโรงงานผลิตน้ำตาล 5 ความเข้มข้น คือ 0, 25, 50, 75 และ 100 ทำการศึกษาในวัสดุปลูก 4 ชนิด คือ ทราย, บุยมะพร้าว, ขี้เลื่อย และขี้เถ้าแก่อน พบว่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์โดยใช้น้ำทึบร้อยละ 100 นอกจากมีไนเตรทและแมกนีเซียม แคดเมียม ตะกั่ว ในไนโตรเจนฟอฟอรัส และโพแทสเซียมสูงที่สุด สำหรับทองแดง นิกเกิล แคลเซียม และแมกนีเซียม พบสะ淀ในผักกาดหอมที่ปลูกในน้ำประปาสูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่าผักกาดหอมที่ปลูกในน้ำทึบร้อยละ 50 มีการเจริญเติบโตส่วนยอด อัตราการเจริญเติบโต ความกว้างของใบ พื้นที่ทรงพุ่ม ดัชนีพื้นที่ในน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูงสุด เมื่อปลูกผักกาดหอมในวัสดุปลูกโดยใช้น้ำทึบพบว่า ผักกาดหอมที่ปลูกในบุยมะพร้าวมีการสะ淀ไนเตรทของไนโตรเมียมสูง ส่วนผักกาดหอมที่ปลูกในขี้เถ้าแก่อนมีตะกั่วและทอง แดงสะสมสูง และการปลูกในทรายและขี้เลื่อยทำให้มีนิกเกิลสะสมมากที่สุด แต่เมื่อปลูกผักกาด- หอมในวัสดุปลูกทุกชนิดไม่พบการสะ淀แคลเดเมียม และผักกาดหอมที่ปลูกในบุยมะพร้าว มีการเจริญเติบโตส่วนยอด อัตราการเจริญเติบโต ความกว้างของใบ พื้นที่ทรงพุ่ม ดัชนีพื้นที่ในน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งดีที่สุด ธรรมศักดิ์และปรียารักษ์ (2544) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของวัสดุปลูกที่มีต่อการออกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินโดยใช้เทคนิค NFT (Nutrient Film Technique) โดยใช้วัสดุปลูก 10 ชนิด พบร่วมกับวัสดุปลูกเพอร์ไลท์ ให้การ

เจริญเติบโตในด้านของน้ำหนักสดใน น้ำหนักแห้งใบ จำนวนใบ และพื้นที่ใบตี่ที่สุด ศรีสุนันท์และเยาวพา (2545) ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคน้าในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้คิน จากการทดลองพบว่า คน้าที่ปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นทรายหยาบผสมถ่านแกลง ผสมขุยมะพร้าว มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีที่สุด โดยมีความแตกต่างของย่างมีนัยสำคัญกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของคน้าที่ปลูกในวัสดุชนิดอื่นๆ คน้าที่ปลูกในทรายหยาบผสมถ่าน แกลงและทรายหยาบผสมขุยมะพร้าวมีความสูงของต้นเมื่ออายุ 40 วันหลังปลูกเท่ากับ 33.5 และ 32.6 เซนติเมตร ตามลำดับ มีน้ำหนักสดใบและลำต้นเท่ากับ 56.5 และ 39.2 กรัมต่อต้น และ 55.2 และ 35.2 กรัมต่อต้น ตามลำดับ และมีน้ำหนักแห้งใบและน้ำหนักต้นเท่ากับ 4.4 และ 2.4 กรัมต่อต้น และ 4.0 และ 1.8 กรัมต่อต้น รัญพิศิษฐ์และชัยวัฒน์ (2545) ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแตงเทาในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้คิน จากการทดลองพบว่า ต้นแตงเทาที่ปลูกในทรายผสมพิทและพิทผสมเวอร์มิคูลาท มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสัดส่วนการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแตงเทาที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ อิสริยากรณ์และนชา (2548) รายงานผลการวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ในการใช้สารละลายน้ำอินทรีย์ ทดแทนสารละลายน้ำอุ่นอาหารพืชในการปลูกผักภาคช่องเตี้ยวระบบไฮโดรโปนิกส์ พบร่วมกับการใช้สารละลายน้ำอุ่นอาหารปกติย่างเดียวให้น้ำหนักต้นสูงสุดและให้ผลไม่แตกต่างกันทางสัดส่วน เมื่อเทียบกับการใช้สารละลายน้ำอุ่นอาหารผสมกับน้ำสักดี้ชีวภาพสัดส่วน 1:1 น้ำสักดี้ชีวภาพที่ใส่เพิ่มลงไปในสารละลายน้ำอุ่นอาหารเพิ่มขึ้นปกติไม่ทำให้ผลผลิตผักภาคช่องเตี้ยวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด การใช้สาร ละลายน้ำอุ่นอาหารปกติมากกว่า 50% คำรับการทดลองที่ใส่น้ำสักดี้ชีวภาพสัดส่วน 1:1 หรือปุ๋ยน้ำอุ่น 15-15-15 หรือปุ๋ยน้ำอุ่น N-100 ppm พืชให้ผลผลิตต่ำกว่าการใช้สารละลายน้ำอุ่นอาหารปกติมากกว่า 50% คำรับการทดลองที่ใส่น้ำสักดี้ชีวภาพสัดส่วน 1:1 หรือปุ๋ยน้ำอุ่น N-100 ppm ให้ผลผลิตสูงกว่าคำรับที่ใส่สารละลายน้ำอุ่นอาหารปกติ แต่ K ให้ผลต่ำกว่าคำรับที่ใส่น้ำสักดี้ชีวภาพสัดส่วน 1:1 ร่วมกับน้ำสักดี้ชีวภาพสูงกว่าคำรับการทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ ธีรศักดิ์และคณะ (2549) รายงานการวิจัยการศึกษาการเจริญเติบโตของผักภาคห้อมและผักกวางตุ้งช่องเตี้ยวนวัสดุปลูกบางชนิด พบว่าวัสดุปลูกที่มีเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าการนำไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการปลูกพืชที่ดีที่สุด คือ ในไผ่หมัก : ทราย อัตราส่วน 1:1 เมื่อปลูกผักภาคห้อมบนวัสดุผสมของไผ่หมัก : ถ่านแกลง : ทราย หรือขุยมะพร้าว : ถ่านแกลง : ทราย พบว่าผักภาคห้อมมีความสูงของต้น ความกว้างทรงพุ่ม น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูงกว่าต้นที่ปลูกบนวัสดุผสมของไผ่หมัก : ถ่านแกลง, ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลงหรือคินสำหรับกวางตุ้งช่องเตี้ยวนวัสดุผสมของไผ่หมัก : ถ่านแกลง : ทราย, ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลง : ทราย หรือคิน มีความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง สูงกว่าต้นที่ปลูกบนวัสดุผสมของไผ่หมัก

ไฝ่หมัก : ถ่านแกลบหรือขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ ตามลำดับ และยังพบว่าวัสดุผสมที่ไม่มีรายปีนส่วนผสมทั้งสองชนิดนี้ มีการยูบตัวของวัสดุสูงที่สุด

